

dispersion, qui paraît s'étendre du Cambodge occidental au Siam septentrional.

Que l'on préfère l'appellation de M. Hemsley qui est antérieure, ou la nôtre qui est postérieure mais répond à une diagnose certaine, il n'en est pas moins hors de doute que l'*Achilus siamensis* Hemsley ou *G. siamensis* Hemsley n'est que le *G. graminifolia* Gagnep.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE ⁽¹⁾

R. ZEILLER. Observations sur quelques plantes fossiles des Lower Gondwanas, 1^{er} fascicule du II^e vol. des nouvelles séries du *Paleontologia indica*; in-4^o, 40 pages et VII planches. Calcutta et Londres, 1902.

Depuis la publication du très important ouvrage du Dr Ottokor Feistmantel, sur la *Fossil Flora of the Gondwana System*, de nombreuses empreintes végétales ont été recueillies, sur divers points de l'Inde, dans les Lower Gondwanas, c'est-à-dire dans la partie inférieure du système, laquelle est d'âge permo-triasique. La direction du Geological Survey les a confiées à M. R. Zeiller, en vue de les examiner, de les déterminer, et d'en faire l'objet d'une publication destinée à servir de supplément à l'ouvrage que je viens de nommer.

La collection communiquée était considérable par le nombre des échantillons, s'élevant environ à 350, la plupart se référant à des espèces déjà connues; mais ils ont fourni une quantité de localités soit complètement nouvelles, soit déjà mentionnées par Feistmantel, mais à la florule desquelles M. Zeiller a pu ajouter des espèces qu'il n'y avait point observées. De plus, certains échantillons ont fourni d'utiles compléments à la connaissance des espèces déjà décrites; enfin sept espèces nouvelles ont été reconnues, soit une addition d'environ 10 pour 100 au chiffre des espèces déjà connues.

(1) Il est rendu compte de tout ouvrage envoyé en deux exemplaires au Secrétaire général de la Société.